

ADMINISTRE DUPIXENT® DE FORMA CORRECTA. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO

1

SAQUE DUPIXENT® DE LA NEVERA 45 MINUTOS ANTES DE SU ADMINISTRACIÓN.


INYECCIÓN SOLO POR EL CUIDADOR

AUTOINYECCIÓN O POR EL CUIDADOR

2


Seleccione el lugar de inyección distinto al de la última administración. Lávese las manos y desinfecte el lugar de inyección con una bola de algodón o gasa y alcohol.

3



Tire del capuchón verde hacia fuera.

4



Coloque la cubierta amarilla de la aguja sobre su piel con un ángulo de aproximadamente 90 grados y de tal forma que pueda ver la ventana.

5




Presione la pluma precargada firmemente contra su piel hasta que no pueda ver la cubierta amarilla de la aguja y manténgala así. Habrá un "clic" cuando comience la inyección. La ventana comenzará a volverse amarilla. La inyección puede tardar hasta 20 segundos.

6



Continúe sujetando con firmeza la pluma precargada contra su piel. Puede oír un segundo "clic". Compruebe que toda la ventana se ha vuelto de color amarillo. Después levante la pluma de la piel.

7



Después de se ha completado su inyección, tire recto hacia arriba para retirar la pluma precargada de la piel y deseche la pluma.

8

TRAS DESECHAR LA JERINGA, ANOTE LA FECHA Y EL LUGAR DE LA INYECCIÓN Y LA FECHA DE LA PRÓXIMA INYECCIÓN EN 14 DÍAS.

RECUERDE

- Lea las instrucciones antes de su uso.
- Conserve Dupixent® en la nevera, entre 2 y 8 grados.
- No agite o caliente la jeringa.
- Lave sus manos antes y después de la administración.
- Limpie la zona de administración antes de la inyección.
- No use la jeringa si ha sufrido daños o si observa que el medicamento está turbio, decolorado o contiene partículas.
- No administre Dupixent® en zonas inflamadas.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Puede contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener. La parte final de la sección 4 del prospecto incluye información sobre cómo comunicar estos efectos adversos.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Puede contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener. La parte final de la sección 4 del prospecto incluye información sobre cómo comunicar estos efectos adversos.

Su médico le ha indicado

▼ Dupixent[®] cada 14 días

**Fecha
inyección**

**Lugar de la
inyección**

**Fecha próxima
inyección
(14 días más tarde)**

RECUERDE

- Lea las instrucciones antes de su uso.
- Conserve Dupixent® en la nevera, entre 2 y 8 grados.
- No agite o caliente la jeringa.
- Lave sus manos antes y después de la administración.
- Limpie la zona de administración antes de la inyección.
- No use la jeringa si ha sufrido daños o si observa que el medicamento está turbio, decolorado o contiene partículas.
- No administre Dupixent® en zonas inflamadas.

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Puede contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener. La parte final de la sección 4 del prospecto incluye información sobre cómo comunicar estos efectos adversos.